

Linfogranuloma Venéreo (LGV)

¿Qué es el linfogranuloma venéreo (LGV)?

El LGV es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) o infección que compromete los ganglios linfáticos del área genital. Es producido por una variedad específica de la clamidia.

¿Quiénes contraen el LGV?

La mayor incidencia ocurre entre personas sexualmente activas que viven en climas tropicales o subtropicales. También ha ocurrido en ciertas áreas del sur de los Estados Unidos.

¿Cómo se contagia el LGV?

La infección se contagia a través del contacto sexual.

¿Cuáles son los síntomas del LGV?

El primer síntoma puede ser la presencia de un grano o lesión, pequeña e indolora en el pene o la vagina. Suele pasar desapercibida. La infección luego se extiende a los ganglios linfáticos del área de la ingle y de allí, a los tejidos que la rodean. Las complicaciones pueden incluir ganglios linfáticos inflamados e hinchados, que pueden presentar secreción y sangrar.

¿Qué tan pronto aparecen los síntomas?

El inicio de los síntomas varía mucho. La lesión inicial puede aparecer entre tres y 30 días después de la exposición.

¿Cuándo y durante cuánto tiempo puede una persona contagiar el LGV?

Una persona permanece infecciosa mientras tenga lesiones activas.

¿Cuál es el tratamiento para el LGV?

El tratamiento consiste en el uso de ciertos antibióticos, específicamente tetraciclina o sulfametoxazol.

¿Qué se puede hacer para prevenir el contagio con el LGV?

Son varias las maneras de evitar el contagio con el LGV:

- Limite la cantidad de compañeros sexuales.
- Utilice un condón masculino o femenino.
- Lave sus genitales a fondo después de las relaciones sexuales.
- Si usted piensa que puede estar infectado(a), evite el contacto sexual y acuda a su clínica local de ETS, a un hospital o visite a su médico.
- Notifique a todos sus contactos sexuales de inmediato para que puedan ser examinados y tratados.

Revised: Junio 2004